


Rational Drug Use Hospital

สถานการณ์ปัจจุบันของทุกโรงพยาบาล




RDU ขั้น ๒

- ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ ๑
- ตัวชี้วัดที่ ๖
- ตัวชี้วัดที่ ๗
- ตัวชี้วัดที่ ๘
- ตัวชี้วัดที่ ๙
- ตัวชี้วัดที่ ๑๑
- ตัวชี้วัดที่ ๑๔
- ตัวชี้วัดที่ ๑๗
- RUA (ร้อยละ ๖๐)

RDU ขั้น ๑


- ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
- ตัวชี้วัดที่ ๒ ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นำสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การดำเนินงานในการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน ๑๓ กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก ๘ รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
- RUA ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค (ร้อยละ ๔๐)

ตัวชี้วัดที่ ๖
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก




ตัวชี้วัดที่ ๗

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน




ตัวชี้วัดที่ ๘
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ




ตัวชี้วัดที่ ๙

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด




ตัวชี้วัดที่ ๑๑

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า ๖๐ มล./นาที/๑.๗๓ ตารางเมตร




ตัวชี้วัดที่ ๑๔
ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs



ตัวชี้วัดที่ ๑๗


จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)



ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA


ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค (ร้อยละ ๖๐)



ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA ตราด

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค (ร้อยละ ๖๐)




	หนองเสม็ด	หนองโสน	หนองคันทรง	ห้วงน้ำขาว	อ่าวใหญ่	อ่าวช่อ	บ้านปลายคลอง	บ้านท้ายวัง	บ้านเกาะขวาง	ห้วยแร้ง	บ้านฉางเกลือ	เนินทราย	บ้านโพรงตะเฆ่	ท่าพริก	ท่ากุ่ม	คลองขวาง	ตะกาง	ชำราก	แหลมกลัด	บ้านท่าเส้น	รวม
RI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AD	100	100	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	75
RI&AD	100	100	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	75

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA บ่อไร่

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค (ร้อยละ ๖๐)




	บ้านมะนาว	บ้านปะอา	บ้านคลองแอ่ง	บ้านหมื่นด่าน	ช้างทูน	บ้างหนองแฟบ	บ้านสามแยกด่านชุมพล	บ้านทับทิมสยาม	ด่านชุมพล	เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา	บ้านคอแล	บ้านทุ่งยาว	บ้านมะม่วง	รวม
RI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	92.31
RI&AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	92.31

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA เขาสมิง

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ร้อยละ 60)




	เขาสมิง	บ้านชุมแสง	บ้านพนมพริก	บ้านโป่ง	บ้านม้อ	ท่าโสม	สะตอ	บ้านคลองปูก	บ้านดินแดง	ประณีต	บ้านตาระวาย	บ้านเกษมสุข	เจียรพัฒนา	บ้านตรอกกระสังข์	บ้านตามาง	รวม
RI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100	86.67
RI&AD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100	86.67

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA คลองใหญ่

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ร้อยละ 60)




	ไม้รูด	บ้านห้วงโสม	บ้านคลองมะขาม	หาดเล็ก	รวม
RI	100	100	100	100	100
AD	100	100	100	100	100
RI&AD	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA แหลมงอบ

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ร้อยละ 60)




	น้ำเชี่ยว	บางปิด	บ้านบางกระดาน	คลองใหญ่	บ้านเนินดินแดง	บ้านธรรมชาติบน	บ้านธรรมชาติล่าง	รวม
RI	100	100	100	100	100	100	100	100
AD	100	100	100	100	100	100	100	100
RI&AD	100	100	100	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA เกาะช้าง

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ร้อยละ 60)




	บ้านคลองสน	บ้านคลองพร้าว	บ้านบางเบ้า	บ้านสลักเพชร	บ้านเจ็กแป๊	รวม
RI	0	0	0	100	0	20
AD	0	0	0	100	0	20
RI&AD	0	0	0	100	0	20

ตัวชี้วัดระดับรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ

RUA เกาะกูด

ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ร้อยละ 60)



Thank you ☺