


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)



สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

สถานการณ์ทั่วโลก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

พบผู้ป่วย 80,078 ราย ใน 37 ประเทศ เสียชีวิต 2,699 ราย (จีน 2,663 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย
ฮ่องกง 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย ไต้หวัน 1 ราย อิหร่าน 12 ราย Diamond Princess 3 ราย
เกาหลีใต้ 8 ราย อิตาลี 7 ราย)

ประเทศจีน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

พบผู้ป่วย 77,658/ ราย เสียชีวิต 2,663 ราย

ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

1. พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 35 ราย อยู่ระหว่างรักษา 14 ราย กลับบ้านแล้ว 21 ราย
2. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสม 1,355 ราย
 - คัดกรองจากสนามบิน 68 ราย
 - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 1,287 ราย


อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 1,071 ราย (ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล) ยังคงรับ
ไว้ในห้องแยกโรค 284 ราย

สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

จังหวัดตราดยังไม่พบ
ผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีการดูแลผู้ป่วยที่ตระหนักเข้ารับการรักษา 12 ราย
เข้าข่าย PUI (ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค) 6 ราย
- ผลตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย

คาดการณ์ฉากทัศน์ (Scenario) การระบาดในประเทศไทย



เตรียมการเปลี่ยนผ่าน สู่ระยะที่ 3

SARS / MERS-CoV response model

Model: Early detection and containment

- ตรวจจับในผู้เดินทาง
 - เฝ้าระวังใน รพ. และ ชุมชน
 - แยกผู้ป่วย, วินิจฉัย, ดูแลรักษา, ป้องกันการแพร่เชื้อ
 - ติดตามผู้สัมผัส เก็บตัวอย่างตรวจ
- ควบคุมการระบาดในวงจำกัด
- สื่อสารความเสี่ยง แนะนำการเดินทาง

Pandemic flu response model

Model: Mitigation of impacts

- คงมาตรการเฝ้าระวังที่ รพ. และ ชุมชน
- ขยายศักยภาพ รพ. ในการดูแลรักษา และ OPD one stop service
- Admit เฉพาะอาการรุนแรง ป้องกันการตาย
- Self quarantine, รพ.สนาม
- สื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันตนเองให้มาก
- NPI: งดกิจกรรมการชุมนุม ปิดสถานที่ที่เกิดการระบาด
- ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

การรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในขณะที่มีการระบาดแพร่ขยายในประเทศ

มาตรการในการชะลอการแพร่ระบาด

- ◆ Social distancing เช่น Work from home, internet shopping,.....
- ◆ การป้องกัน large outbreak เช่น ในโรงเรียน ในเรือนจำ ในสถานที่ทำงาน
- ◆ มาตรการการป้องกันการแพร่โรคในผู้ป่วย ได้แก่ การให้ผู้ป่วยหยุดงาน
การใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
- ◆ การสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
- ◆ Clean Thailand
- ◆ ใส่หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง

ขอความร่วมมือ

- ทุกส่วนราชการทำความอุปการณที่หยิบจับบ่อยๆ จุดสัมผัสร่วม ในหน่วยงานของท่านสม่ำเสมอ ทุกวัน
- ปฏิบัติตัวเองให้ปลอดภัย โดย กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเวลาไปในที่ชุมชน
- ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดขยะติดเชื้อจากการใช้หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง (ซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต)
- ขอความร่วมมืองดการเดินทางไปประเทศ จีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ไต้หวัน, มาเก๊า, ฮองกง, เกาหลี ถ้าไม่จำเป็น

การเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสมเพื่อบรรเทาความขาดแคลน

หน้ากากผ้า



สำหรับผู้ที่ไม่
มีอาการหวัด

หน้ากากอนามัย

ทางการแพทย์



สำหรับผู้ที่มีอาการหวัด
และผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วย

หน้ากาก N95



สำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์

