


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก




อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ปี 2556 - 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคใช้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.ตราด

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(ราย)



Median	7	12	3	4	11	25	40	43	19	10	4	5	7	12	3	4	11
2565	0	0	2	0	4	5	10	10	15	22	11	20	38	8			

2565

18 ก.พ. 2566

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ติดตามประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อย่างเข้มข้น (สุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน ค่า HI CI)
- แจ้งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการเฝ้าระวัง ตามมาตรการ 3-3-1 (รายงานผู้สงสัย หรือผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังมี การวินิจฉัย, การลงควบคุมโรค เร็วภายใน 3 ชั่วโมง และการควบคุมโรคภาพรวมในชุมชนที่เกิดโรคภายใน 1 วัน หลังจากรับแจ้งรายงาน ผู้ป่วย)
- สื่อสารความเสี่ยง สร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ (แจ้งสถานการณ์ การพบผู้ป่วย ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย)
- หน่วยบริการทบทวน CPG ในเฝ้าระวัง วินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก/จัดตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก (Dengue corner) ในหน่วย บริการ
- ประสานคลินิก ร้ายยา เฝ้าระวัง และระวังเรื่องการจ่ายยากลุ่ม NSAID
- ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่อง เตรียมความพร้อมด้าน บุคลากร เวชภัณฑ์ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ฟ่นเคมีภัณฑ์, ทราายที่มีฟอส, เคมีภัณฑ์ฆ่ายุง เป็นต้น)
- ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อกำหนดมาตรการเฉพาะชุมชน ให้สามารถควบคุมการระบาดไม่ให้เกิด 2nd gen

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้ปีนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1745
BPK HOTLINE

0-2109-3111
www.bangkok3.com
E-mail : info@bangkok3



BPK โรงพยาบาล
BANGPAKOK HOSPITAL

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้

โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดยใช้มาตรการ 5ป 1ว



ปิดฝาภาชนะ
ให้สนิท



ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้ปีนแหล่ง
เพาะพันธุ์



เปลี่ยนน้ำ
ในภาชนะที่
ปิดไม่ได้



ชั่งไข่ยุง
ทิ้งน้ำที่ชั่งล้าง
บนพื้นดิน เพื่อให้
ไข่แห้งตาย



ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่าง
ต่อเนื่อง
ทุกๆ 7 วัน

5ป
1ว

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 | เครื่องช่วยบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

