



สรุปผลการดำเนินงาน การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี




ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

■ ร้อยละการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี เขตสุขภาพที่ 6

$\bar{x} = 70.74$ $SD. = 13.50$

■ เขียว $\bar{x} + 1SD > 84.24\%$ ■ เหลือง $\bar{x} \pm SD \ 57.24\% - 84.24\%$ ■ แดง $\bar{x} - 1SD < 57.24\%$



$$D = \frac{(B + C) \times 100}{(A + C)}$$


A = เด็กตามกลุ่มอายุที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)

B = เด็กตาม A ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

C = เด็กนอกกลุ่ม A ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

D = ผลงานภาพรวม


■ ร้อยละการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอันแน่น Hematocrit
(กลุ่มอายุ 6 เดือน – 11 เดือน 29 วัน) เขตสุขภาพที่ 6



$$D = \frac{(B + C) \times 100}{(A + C)}$$

A = เด็กกลุ่มอายุ 6 เดือน – 11 เดือน 29 วัน
 B = เด็กตาม A ที่ได้รับการเจาะ Hct. ทั้งหมด
 C = เด็กนอกกลุ่ม A ที่ได้รับการเจาะ Hct. ทั้งหมด
 D = ผลงานภาพรวม

■ภาวะโลหิตจาง ในเด็ก 6 เดือน – 2 ปี (Hematocrit<33) เขตสุขภาพที่ 6




ระดับปัญหาโลหิตจาง	ความชุกโลหิตจาง
รุนแรง	≥ 40
ปานกลาง	20 - 39.9
เล็กน้อย	5 - 19.9
ปกติ	≤ 4.9

เกณฑ์การประเมินปัญหาโลหิตจางในกลุ่มประชากร (เชิงสาธารณสุข)

ที่มา : Iron Deficiency Anemia
Assessment, Prevention, and Control.
WHO 2001

ร้อยละการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี : จังหวัดตราด



$$D = \frac{(B + C) \times 100}{(A + C)}$$


A = เด็กตามกลุ่มอายุที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)

B = เด็กตาม A ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

C = เด็กนอกกลุ่ม A ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

D = ผลงานภาพรวม

ร้อยละการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอันแน่น Hematocrit
(กลุ่มอายุ 6 เดือน – 11 เดือน 29 วัน) : จังหวัดตราด



$$D = \frac{(B + C) \times 100}{(A + C)}$$


A = เด็กที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) อายุ 6 เดือน - 11 เดือน 29 วัน

B = เด็กตาม A ที่ได้รับการเจาะ Hct. ทั้งหมด

C = เด็กนอกกลุ่ม A ที่ได้รับการเจาะ Hct. ทั้งหมด

D = ผลงานภาพรวม

ภาวะโลหิตจาง ในเด็ก 6 เดือน – 2 ปี (Hematocrit<33) : จังหวัดตราด




ระดับปัญหาโลหิตจาง	ความชุกโลหิตจาง
รุนแรง	≥ 40
ปานกลาง	20 - 39.9
เล็กน้อย	5 - 19.9
ปกติ	≤ 4.9

เกณฑ์การประเมินปัญหาโลหิตจางในกลุ่มประชากร (เชิงสาธารณสุข)

ที่มา : Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention, and Control. WHO 2001

การจ่ายย่น้ำเสริมธาตุเหล็กเด็ก 6 ด.-5ปี

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับย่น้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562



เด็ก 6ด.-5ปี รับย่น้ำธาตุเหล็ก อ.เกาะช้าง

